


**Producent**  
**lub**  
**Podmiot wprowadzający**  
**lub**  
**Posiadacz zezwolenia:**



## Zawartość substancji czynnych:

**2,4-D - kwas - 600 g/l**

(związek z grupy fenoksykwasów)



- + efekt chwastobójczy widoczny szybko po zastosowaniu
- + skuteczny w zwalczaniu chabra bławatka odpornego na ALS
- + idealny partner do komponowania własnych mieszanin
- + bezpieczny dla roślin następczych

# AMINOPIELIK STANDARD 600 SL

## Opis działania:

**Aminopielik Standard 600 SL** jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, życie ozimym.

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 6 liści. Środka nie stosować w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.

### Chwasty wrażliwe:

w dawce 1,0 l/ha: komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

w dawce 1,25 l/ha: chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa

### Chwasty średnio wrażliwe:

w dawce 1,0 l/ha: chaber bławatek, jasnota różowa, ostróżeczka polna, wyka drobnokwiatowa

w dawce 1,25 l/ha: jasnota różowa, mak polny

### Chwasty średnio odporne:

w dawce 1,25 l/ha: bratek polny, maruna bezwonna, przetacznik błuszczykowy

### Chwasty odporne:

w dawce 1,0 l/ha: mak polny

w dawce 1,25 l/ha: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy

## Stosowanie:

### JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA

- + termin stosowania: od fazy 4 - 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14 - 29)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha

### PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME

- + termin stosowania: wiosną od początku fazy krzewienia (4 - 5 liści) do jej końca (BBCH 14 - 29)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.