

Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:




Dow AgroSciences

Zawartość substancji czynnych:

florasulam - 150 g/kg

aminopyralid - 300 g/kg



- + wysoka skuteczność nawet w niskich temperaturach
- + kompletne rozwiązanie na większość chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych
- + idealny partner do preparatów zwalczających miotłę zbożową w zbożach ozimych

DRAGON 450 WG

Opis działania:

Dragon 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie preparatu jest szybsze, natomiast przy niskich temperaturach (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Chwasty wrażliwe:

chaber bławatek, fiołek polny (przed kwitnieniem), gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała (w fazie do 4 - 6 liści właściwych), mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe:

babki, bodziszk, fiołek polny (w fazie kwitnienia), jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślak polny, mniszek pospolity, powój polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczowy, skrzyp polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku

Chwasty odporne:

chwasty jednoliścienne

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

- + termin stosowania: wiosną od początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 21 - 31)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33,3 g/ha

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej można stosować łącznie ze środkami zwalczającymi miotłę zbożową.

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i mączniaka prawdziwego zbóż można stosować mieszaninę: Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atlas 500 SC 0,2 l/ha

JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA

- + termin stosowania: od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 13 - 31)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 33,3 g/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.