

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

fenoksaprop-P-etylu - 69 g/l (6,54%)
(związek z grupy arylofenoksykwasydów)



**PSZENICA
OZIMA
I JARA**



**JĘCZMIEN
JARY**

- + wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej, owsa głuchego, wyczyńca polnego
- + możliwość stosowania niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej
- + idealny preparat do poprawek na chwasty jednoliścienne
- + odmienny mechanizm działania od ALS
- + zalecany w przypadku występowania miotły odpornej na ALS
- + bardzo bezpieczny

FANTOM 069 EW

Opis działania:

Fantom 069 EW to środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powszedniego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Preparat działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2 - 3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.

Działanie środka widoczne jest po upływie 2 - 4 tygodni od zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych. Produkt niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyńiec polny

Chwasty odporne:

kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

- + termin stosowania: wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3. kolanka (BBCH 22 - 33)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1 - 1,2 l/ha

JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA

- + termin stosowania: od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka (BBCH 21 - 31)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.