

**Producent  
lub  
Podmiot wprowadzający  
lub  
Posiadacz zezwolenia:**

**syngenta®**

### Zawartość substancji czynnych:

**pinoksaden - 50 g/l** (5,05%)  
(związek z grupy fenilopirazolin)



**PSZENICA  
OZIMA  
I JARY**



**PSZENŻYTO  
OZIME**



**JĘCZMIEN  
OZIMY  
I JARY**

- + wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej, owsa głuchego, wyczyńca polnego
- + możliwość stosowania we wszystkich zbożach ozimych i jarych (za wyjątkiem owsa)
- + możliwość stosowania zarówno jesienią, jak i wiosną
- + szybciej pobierany i przemieszczany niż pozostałe herbicydy zwalczające miotłę zbożową
- + zalecany do poprawek w przypadku stwierdzenia chwastów odpornych na ALS

# FRAXIAL 50 EC

## Opis działania:

**Fraxial 50 EC** to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

## Stosowanie:

**PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO**  
miotła zbożowa

### zabiegi jesienią

- + termin stosowania: opryskiwać od fazy wykształconego 1. liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji miotły zbożowej
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha

### zabiegi wiosną

- + termin stosowania: opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha

**PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY**  
wyczyńca polny

### zabiegi jesienią

- + termin stosowania: od fazy wykształconego 1. liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji wyczyńca polnego
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

### zabiegi wiosną

- + termin stosowania: od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 - 1,2 l/ha

**PSZENICA JARY, JĘCZMIEN JARY**

owies głuchy, chwastnica jednostronna

- + termin stosowania: opryskiwać od fazy wykształconego 1. liścia do stadium widocznego liścia flagowego rośliny uprawnej (BBCH 11 - 37)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów lub ich masowego występowania na polu.

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.