

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

propikonazol - 250 g/l (25,39%)
(związek z grupy triazoli)



- + dobry partner do mieszanek
- + szeroki zakres rejestracji
- + długi okres stosowania

PROPICOFLASH^{EC}

Opis działania:

Propicoflash EC to środek grzybobójczy o działaniu systemicznym, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

- + termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

PSZENICA JARA

septorioza paskowana liści

- + termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

JĘCZMIEN OZIMY

mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści, rdza karłowa

- + termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 - 50)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

JĘCZMIEN JARY

mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści

- + termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 - 50)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew

- + termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

ŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy, rynchosporioza, rdza brunatna

- + termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

We wszystkich uprawach środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.