


Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:



Zawartość substancji czynnych:

pendimetalina - 400 g/l (36%)
 (związek z grupy dinitroanilin)



- + długotrwały okres działania
- + bezpieczny dla roślin następczych
- + dobra mieszalność z innymi herbicydami

STOMP 400 SC

Opis działania:

Stomp 400 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany dogłębowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w ziemniaku, kukurydzy i ostropestie plamistym.

Preparat pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki

Chwasty średnio wrażliwe:

bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity

Chwasty średnio odporne:

samosiewy rzepaku

Chwasty odporne:

przetacznik polny

Stosowanie:

ZIEMNIAK

- + termin stosowania: przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obrodzeniu i zabronowaniu pola, maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha

Produktu nie należy stosować po wschodach ziemniaków. W celu poszerzenia spektrum zwalczania chwastów środek Stomp 400 SC można stosować przedwschodowo w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC. Zalecana dawka: Stomp 400 SC 3,0 - 4,0 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2,0 l/ha.

KUKURYDZA

- + termin stosowania: bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

OSTROPEST PLAMISTY

- + termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.