

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

chlorek mepikwatu - 300 g/l (4,4%)
(związek z grupy piperydyn - pentametylenoimin)

proheksadion wapnia - 50 g/l (26,5%)
(związek z grupy cykloheksanodionów)



- + elastyczny czas stosowania i dawki
- + silniejsze źdźbła, mocniejszy system korzeniowy
- + skuteczniejszy w niższych temperaturach w porównaniu do trineksapaku
- + większa produkcja lignin w porównaniu do trineksapaku

CANOPY

Opis działania:

Canopy jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin o działaniu systemicznym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

- + termin stosowania: od początku wzrostu źdźbła lub w fazie liścia flagowego, 1 raz w sezonie
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,25 l/ha

PSZENŻYTO OZIME

- + termin stosowania: w fazie liścia flagowego, jeden raz w sezonie
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,25 l/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.