

**Producent  
lub  
Podmiot wprowadzający  
lub  
Posiadacz zezwolenia:**

Organika Sarzyna  Ciech

## Zawartość substancji czynnych:

**MCPA - 750 g/l** (63,6%)

(związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej)




**JĘCZMIĘŃ  
OZIMY  
I JARY**



**PSZENICA  
OZIMA  
I JARA**



**PSZENŻYTO  
OZIME  
I JARE**



**OWIES**



**ŻYTO**

- + znana i uznana substancja aktywna
- + możliwość stosowania we wszystkich zbożach jarych i ozimych
- + brak stwierdzonej odporności chwastów
- + bardzo szybki efekt chwastobójczy
- + bezpieczny zarówno dla zbóż, jak i roślin następczych

# CHWASTOX 750 SL

## Opis działania:

**Chwastox 750 SL** jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 6 liści, przy temperaturach w zakresie 10 - 25°C. Nie stosować, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.

### Chwasty wrażliwe:

dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne

### Chwasty średnio odporne:

bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty

### Chwasty odporne:

bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna

## Stosowanie:

### JĘCZMIĘŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, OWIES

- + termin stosowania: wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21 - 29)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

### JĘCZMIĘŃ OZIMY, PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

- + termin stosowania: wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21 - 29)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.