

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:


tebukonazol - 250 g/l (25,8%)
(związek z grupy triazoli)




**PSZENICA
OZIMA**



**JĘCZMIEN
JARY**



**RZEPAK
OZIMY**



**BURAK
CUKROWY**



WIŚNIA

- + doskonała formułacja
- + niewrażliwy na temperaturę wody
- + nie krystalizuje się
- + uniwersalny partner do mieszanek fungicydowych
- + bardzo szeroka rejestracja, szerokie spektrum zwalczanych chorób
- + wyróżniająca mieszalność z innymi produktami w mieszaninie zbiornikowej

HELICUR 250 EW

Opis działania:

Helicur 250 EW jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym, w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz wiśni przed chorobami grzybowymi.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

- + termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septorioza plew i fuzarioza kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Produkt można stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

JĘCZMIEN JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

- + termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

W sezonie wegetacyjnym wykonać maksymalnie 1 zabieg.

RZEPAK OZIMY

czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

- + termin stosowania: od fazy końca kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 57 - 65)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinie rzepaku.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

tebukonazol - 250 g/l (25,8%)
(związek z grupy triazoli)



- + doskonała formuacja
- + niewrażliwy na temperaturę wody
- + nie krystalizuje się
- + uniwersalny partner do mieszanek fungicydowych
- + bardzo szeroka rejestracja, szerokie spektrum zwalczanych chorób
- + wyróżniająca mieszalność z innymi produktami w mieszaninie zbiornikowej

HELICUR 250 EW

Stosowanie:

RZEPAK OZIMY

sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych

zabiegi jesienią:

- + termin stosowania: w stadium 4 - 8 liści rzepaku (BBCH 14 - 18)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha

Produkt można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie, stopnia wrażliwości na choroby i zimotrwałości uprawianej odmiany.

Stosowanie środka jesienią wpływa dodatkowo na zmniejszenie masy części nadziemnej roślin i poprawia zimotrwałość rzepaku.

Produkt można stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

zabiegi wiosną:

- + termin stosowania: w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31 - 32)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Stosowanie wiosną wpływa również na skrócenie łodyg, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

BURAK CUKROWY

chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób do fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

W sezonie wegetacyjnym produkt można stosować maksymalnie 2 razy.

WIŚNIA

brunatna zgnilizna drzew pestkowych

- + termin stosowania: w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia (BBCH 61 - 66)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie jeden zabieg.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.