

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**




Zawartość substancji czynnych:

fluksapyroksad - 62,5 g/l (6,1%)

(związek z grupy karboksamidów)

metkonazol - 45 g/l (4,4%)

(związek z grupy triazoli)



- + bardzo dobra skuteczność
- + szerokie spektrum zwalczanych chorób
- + działanie zapobiegawcze i interwencyjne
- + szybkie przemieszczanie fluksapyroksadu w tkankach roślinnych
- + wysoka odporność na zmywanie

LIBRAX

Opis działania:

Librax jest fungicydem o działaniu układowym, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, żyta i pszenżyta ozimego.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy

- + termin stosowania: środek stosować od fazy pełni krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25 - 69)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 2,0 l/ha

Preparat w dawce 2,0 l/ha dodatkowo ogranicza łamliwość źdźbła.

JĘCZMIEN JARY, JĘCZMIEN OZIMY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

- + termin stosowania: środek stosować od fazy pełni krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25 - 69)
- + maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
- + zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 2,0 l/ha

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna zbóż i traw, septoriozy liści

- + termin stosowania: środek stosować od fazy pełni krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25 - 69)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

ŻYTO

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

- + termin stosowania: środek stosować od fazy pełni krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25 - 69)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym, zachowując między zabiegami odstęp co najmniej 21 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.