

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**

FMC

**Zawartość
substancji czynnych:**

epoksykonazol - 125 g/l (12,02%)
(substancja z grupy trazole)



- + bardzo dobry partner do mieszanek
- + szerokie spektrum zwalczanych chorób

RASTER 125 SC

Opis działania:

Raster 125 SC jest środkiem grzybobójczym o działaniu systemicznym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

JĘCZMIEN JARY

rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia

- + termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 - 59)
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

BURAK CUKROWY

chwościk buraka

- + termin stosowania: natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, zabieg powtórzyć, jeśli wystąpiło ponowne porażenie liści buraków
- + maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

We wszystkich uprawach preparat stosować maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępie 3 - 4 tygodni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.