

**Producent
lub
Podmiot wprowadzający
lub
Posiadacz zezwolenia:**



Zawartość substancji czynnych:

sulkotrion - 300 g/l (27,9%)
(związek z grupy trójketonów)



- + bezpieczny dla kukurydzy, nawet w późniejszych fazach rozwojowych kukurydzy
- + skuteczny nawet na przerośnięte chwasty
- + idealny do późnych zabiegów i na poprawki

SULCOGAN 300 SC

Opis działania:

Sulcogan 300 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów, w mniejszym stopniu również przez korzenie. Pierwsze objawy działania środka są widoczne po 5 - 7 dniach od wykonania zabiegu, a po 14 dniach roślina wysycha. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, szarłat szorstki, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe:

rdest powojowaty, rdest ptasi

Chwasty odporne:

nawłóć pospolita

Stosowanie:

KUKURYDZA

- + termin stosowania: po wschodach chwastów, kiedy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści, na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie 4 - 6 liści
- + maksymalna i zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.